

Ensiapuohjeet

Hyperglykemia eli korkea verensokeri

OIREET

- väsynyt olo
- jano
- tihtynyt virtsaamisen tarve
- lisääntynyt ruokahalu

HOITO

- ota yhteyttä lapsen vanhempiin tai hänen diabetesta hoitavaan yksikköön
- pistä lapselle insuliinia saatujen ohjeiden mukaan

Hypoglykemia eli alhainen verensokeri

OIREET

- väsynyt olo
- huimaus
- nälän tunne
- silmissä sumenee

HOITO

- anna lapselle hiilihydraattipitoista syötävää tai juotavaa, kuten esimerkiksi leipää, lasi maitoa tai tuoremehua

Insuliinisokki eli alhaisesta verensokerista johtuva tajuttomuus

OIREET

- tajuttomuus
- kouristukset

HOITO

- käännä lapsi kylkiasentoon
- sivele posken limakalvolle hunajaa

LAPSI VIRKOOA HETI

- anna lapselle hiilihydraattipitoista syötävää tai juotavaa, kuten esimerkiksi leipää, lasi maitoa tai tuoremehua

Happomyrkytys eli liian korkeasta verensokerista johtuva tila

OIREET

- pahoinvointi, oksentelu, vatsakipu
- jano, suun kuivuminen
- pissattaa paljon
- hengitys huokuu, imelä haju hengityksessä

HOITO

- soita välittömästi hätänumeroon: 112

LAPSI EI VIRKOA

- soita viipymättä hätänumeroon: 112