



Ennen eristämistä (tilanteen kärjistyessä)	Eristämisen aikana	Eristämisen jälkeen
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vuorovaikutuksen lisääminen</li> <li>- Läsnäolo, kuunteleminen</li> <li>- Voinnin kysyminen</li> <li>- Neuvottelu</li> <li>- Tarvittava lääke</li> <li>- Rauhallisemman ympäristön mahdollistaminen</li> <li>- Tarvittaessa tulkkaus</li> </ul> <p>Jos eristäminen on välttämätöntä</p>  <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>Lääkäri määrää aina eristyksen aloittamisesta</p> </div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eristämisen kulusta ja syistä tiedottaminen</li> <li>- Vitaalielintoimintojen seuranta</li> <li>- Erytistarkkailuhuoneessa 15 minuutin välein näkö- ja kuuloyhteys</li> <li>- Leposide-eristyksessä jatkuva näkö- ja kuuloyhteys</li> <li>- Mahdollisuus keskustella hoitajan kanssa</li> <li>- Hygieniasta huolehtiminen</li> <li>- Erytystoiminnan seuranta</li> <li>- Riittävä nesteytys</li> <li>- Tupakoivan nikotiinikorvaushoito</li> <li>- Voinnin jatkuva arviointi ja kirjaukset potilastietoihin</li> <li>- Leposide-eristyksessä tromboosiprofylaksia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lääkäri päättää eristämisen lopettamisesta</li> <li>- Purkukeskustelu potilaan kanssa</li> <li>- Oikeuksista ja valitusmahdollisuudesta tiedottaminen</li> <li>- Purkukeskustelu ja toiminnan arviointi henkilökunnan kesken</li> <li>- Lain edellyttämä raportointi</li> </ul>