

PÄIHTEIDEN VAIKUTUKSISTA JOHTUVIEN HÄLYTTÄVIEN MERKKIEN TUNNISTAMINEN

Tarkkaile vointia!

Tilassa saattaa olla tapahtumassa jotain, joka tarvitsee hoitoa

Yleistila: Pahoinvointi, oksentelu, vatsakipu, ripuli, heikotus
Neurologia: Päänsärky, laajat tai pienet pupillat, tajunnan tason aleneminen, uneliaisuus, ajan ja paikan hämärtymä
Iho/lämpötila: Hikoilu, lämmin tai kuuma iho, vapiseva, kuumeinen
Tajunta: Uneliasuus, nukahteleva, ajan ja paikan hämärtymä
Käyttäytyminen: Aistiharhainen, sekava, ahdistunut, kiihtynyt, motorisesti levoton, aggressiivinen, psykoottinen, ärtynyt, raukea, välinpitämätön
Puhe: Puheen sammaltaminen tai epäselvyys
Lihasoire: Nykiminen, vapina, lihasten jäykkyys, kontrolloimaton liikehdintä

HÄLYTTÄVIÄ MERKKEJÄ!!

Yhteys AINA ensihoitoon
Asiakas kylkiasentoon, jos mahdollista

Tajunta: Tajuton, heikko tajunnantaso tai sen lasku
Hengitys: Hidastunut, epänormaali tai vaikeutunut hengitys
Kouristelu: Kouristelee
Näköhäiriöt: Näköhäiriöt aina sokeutumiseen asti, etenkin jos epäily, että juonut myrkyalkoholeja
Sydänoireet: Rintakivut, korkea pulssi etenkin yhdistettynä stimulantteihin
Hypertermian oireet: Kuuma iho, nykinä, vapina, jäykkyys, sekavuus, pahoinvointi, oksentelu + hengitysoireet ja tajunnantason lasku tai tajuttomuus, ihon kananlihalle meno, näköhäiriöt
Sekava/riehuva: Päihteitä käyttänyt asiakas, jota ei saada rauhoittumaan, etenkin jos hypertermian oireita tai tiedossa että nauttinut stimulantteja. tai asiakas lyönyt pään, tai sairastaa diabetesta
Excited delirium: Voimakas sekavuus, aggressiivisuus, hypertermian oireet, vähäinen vaatetus tai alaston, pyrkii viilentämään itseään, levoton, laajat pupillat, poikkeukselliset voimat, korkea kipukynnys
HUOM! Mikäli asiakas on **sekava/riehuva/hyperterminen/excited deliriumin** oireita
→ **ÄLÄ RAJOITA RINTAKEHÄN LIIKETTÄ ESIM. PAINAMALLA RINTAKEHÄÄ VASTEN LATTIAA**
ja pyri välttämään tilanteita, joissa henkilö joutuu ponnistelemaan, riehumaan tai käyttämään muuta voimakasta lihasaktivaatiota